



SEZNAM NUTNÝCH PŘEDOPERAČNÍCH VYŠETŘENÍCH

ZDRAVÉ DÍTĚ DO VĚKU 18 LET

- pediatrické klinické vyšetření včetně FW, KO, Quick, APTT, moč a sedimentace

DOSPĚLÝ S NEGATIVNÍ ANAMNÉZOU DO 40 LET

- předoperační vyšetření praktického lékaře obsahující: anamnézu, klinické vyšetření, FW, KO, Quick, APTT, moč a sedimentace, jaterní testy, glykémie, CRP, souhrn diagnóz se závěrem vzhledem k riziku plánovaného výkonu

DOSPĚLÝ S NEGATIVNÍ ANAMNÉZOU NAD 40 LET

- stejné předoperační vyšetření jako do 40 let + EKG

DOSPĚLÝ S NEGATIVNÍ ANAMNÉZOU NAD 50 LET

- stejné předoperační vyšetření jako do 40 let + EKG, RTG S+P, urea, kreatinin, ionty

DOSPĚLÝ NEMOCNÝ NEBO S POZITIVNÍ ANAMNÉZOU (ICHS, DM, ...)

- předoperační vyšetření provede internista nebo lékař specialista dle typu onemocnění
- interní vyšetření se závěrem vzhledem k riziku plánovaného výkonu, rozšíření anamnézy a klinického vyšetření dle typu onemocnění

DOPORUČENÍ

- Nejméně 3 týdny před plánovanou operací by u Vás nemělo proběhnout žádné akutní virové nebo bakteriální onemocnění.
- Nejméně 10 dnů před plánovanou operací neužívejte léky na snížení srážlivosti krve obsahující kyselinu acetylsalicylovou, jako např. Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Astro, Godasal, Alnagon, Mironal, Neuralgen, Acylcoffin, Defebrin, Harburettas.
- Použití ostatních léků na snížení srážlivosti krve musí být upraveno s jednoznačným požadavkem normalizace srážlivosti krve.